

続発性高脂血症

1. 高コレステロール血症

- 甲状腺機能低下症 ● ネフローゼ症候群 ● 原発性胆汁性胆管炎 ● 閉塞性黄疸
- 糖尿病 ● Cushing (クッシング) 症候群 ● 褐色細胞腫 ● 神経性食欲不振症
- 薬剤 (利尿薬・ β 遮断薬・コルチコステロイド・経口避妊薬・サイクロスポリンなど)

2. 高トリグリセライド血症

- 飲酒 ● 過食・運動不足 ● 肥満 ● 糖尿病 ● 妊娠
- 腎疾患 (ネフローゼ症候群、慢性腎臓病 (CKD))
- 内分泌疾患 [甲状腺機能低下症、Cushing (クッシング) 症候群、Nelson (ネルソン) 症候群、褐色細胞腫、先端巨大症など]
- 自己免疫疾患 (全身性エリテマトーデスなど)
- その他 (神経性食欲不振症、糖原病、リポジストロフィー、Weber-Christian病、多発性骨髄腫、血清蛋白異常症、リンパ増殖性疾患、特発性血小板減少性紫斑病、アミロイドーシス、サルコイドーシスなど)
- 薬剤 (利尿薬・非選択性 β 遮断薬・陰イオン交換樹脂・コルチコステロイド・エストロゲン・経口避妊薬・クロミフェン・タモキシフェン・テストステロン・レチノイド (ベキサロテンなど)・免疫抑制薬 (シクロスポリン、タクロリムスなど)・抗がん剤 (シロリムス、カペシタビン、シクロフォスファミド、アスパラギナーゼなど)・抗ウィルス薬 (抗HIV 薬など)、抗精神病薬、抗うつ薬、SSRI、抗痙攣薬、麻酔薬、座瘡治療薬など)

日本動脈硬化学会 脂質異常症診療ガイド2023年版 P38 表7-4より

続発性低脂血症

1. 低LDL-C 血症

- 重症肝疾患 ● 甲状腺機能亢進症 ● 副腎不全 ● 吸収不良 ● 栄養不良
- 悪性腫瘍 ● 骨髄増殖性疾患 ● 慢性感染症 ● 慢性炎症性疾患
- Gaucher (ゴーシェ) 病 ● 薬剤

2. 低HDL-C 血症

- 喫煙 ● 肥満 ● 運動不足 ● 糖尿病 ● 自己免疫疾患 ● 重症肝疾患
- 慢性腎不全、慢性腎疾患 (CKD) ● 栄養不良、外科手術後、全身性炎症性疾患の急性期
- Gaucher (ゴーシェ) 病 ● 薬剤 (蛋白同化ステロイド、 β 遮断薬、プロブコールなど)

日本動脈硬化学会 脂質異常症診療ガイド2023年版 P39 表7-5より