

## 「動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2017 年版」第1刷 正誤表

「動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2017 年版」の本文中に誤植がありました。お詫びして訂正致します。

頁	訂正箇所		誤	正	
13	右段	下から3行目	③脳出血	③脳卒中	
14	図 1-1	表組「吹田スコアの得点」欄外	吹田スコアは図4-2に基いて計算する	吹田スコアは図1-2に基いて計算する	
		注)	家族性Ⅲ型高指血症	家族性Ⅲ型高脂血症	
15	図 1-2	「吹田スコア、①～⑧の合計得点」囲み内	65-70	66-70	
			≥ 70	≥ 71	
		④血圧*	Ⅱ度高血圧 SBP≥160-179 かつ/または DBP≥100-109	Ⅱ度高血圧以上 SBP≥160 かつ/または DBP≥100	
16	図1-3	「以下の危険因子の個数をカウントする」の囲み内	③低HDLコレステロール	③低HDLコレステロール	
18	表 1-4	主な一般名	スタチン	ビタバスタチン	ビタバスタチン
			プロブコール	プロブコール	プロブコール
			多価不飽和脂肪酸	イコサペント酸エチル	イコサペント酸エチル
				オメガ-3脂肪酸エチル	オメガ-3脂肪酸エチル
			MTP 阻害薬*	ロミタピド	ロミタピド
分類	多価不飽和脂肪酸	n-3系多価不飽和脂肪酸			
41	左段	下から14行目	166mg/dL	167mg/dL	
50	表4-1	「久山町研究」の「評価に用いている危険因子」	性別、年齢、LDLコレステロール、HDLコレステロール、糖尿病、喫煙	性別、年齢、LDLコレステロール、HDLコレステロール、糖尿病、収縮期血圧、喫煙	
56	右段	文献9)	野田浩之	野田博之	
53	図 4-2	「吹田スコア、①～⑧の合計得点」囲み内	65-70	66-70	
			≥ 70	≥ 71	
		④血圧*	Ⅱ度高血圧 SBP≥160-179 かつ/または DBP≥100-109	Ⅱ度高血圧以上 SBP≥160 かつ/または DBP≥100	
54	図4-3	「以下の危険因子の個数をカウントする」の囲み内	③低HDLコレステロール	③低HDLコレステロール	
69	CQ13	CQ13の囲み内 上から2行目	動脈硬化疾患	動脈硬化性疾患	
83	左段	上から6行目	PCSK-9	PCSK9	
87	表 4-7	主な一般名	スタチン	ビタバスタチン	ビタバスタチン
			プロブコール	プロブコール	プロブコール
			多価不飽和脂肪酸	イコサペント酸エチル	イコサペント酸エチル
				オメガ-3脂肪酸エチル	オメガ-3脂肪酸エチル
			MTP 阻害薬*	ロミタピド	ロミタピド
分類	多価不飽和脂肪酸	n-3系多価不飽和脂肪酸			
86	Q2のA	囲み内A 上から1行目	多価不飽和脂肪酸	n-3系多価不飽和脂肪酸	
86	Q2のA	囲み内A 上から3行目	PCSK-9	PCSK9	
88	右段	上から3行目	多価不飽和脂肪酸	n-3系多価不飽和脂肪酸	
91	Q23のQ	囲み内Q 上から2行目	n-3多価不飽和脂肪酸	n-3系多価不飽和脂肪酸	
104	表4-10	囲み内 上から2行目	非心原性脳梗塞	非心原性脳梗塞	
143	参考資料1	左列	慢性腎臓病	eGFR>=60	

(2018年8月22日版)